

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für Deine Fehlerhinweise, Dein Lob und Deine Kritik zum ALLEX bedanken. Damit hilfst Du uns sehr ALLEX noch besser zu machen! Wir überprüfen jeden Fehlerhinweis und aktualisieren regelmäßig unbekannte Fehler in unserem Online-Erratum.

Du hast einen Fehler gefunden, der noch nicht im Erratum steht oder möchtest uns Anregungen geben, was wir verbessern können? Wir freuen uns über jedes einzelne Feedback, das bei uns eingeht. Schreibe doch einfach eine Email an:

<https://www.thieme.de/de/thieme-gruppe/kontaktformular-15211.htm>

„Einen Fehler machen und ihn nicht korrigieren - das erst heißt wirklich einen Fehler machen.“

(Konfuzius)



ALLEX Alles fürs Examen!

Erratum für die 2. Auflage von AllEx – Alles fürs Examen

Seite	Änderungs-Status	aktueller Text	neuer Text
Band A			
49 (rechte Spalte)		Patienten, die einen Herzstillstand überstanden haben, sollten für 12-14 h auf eine Körperkerntemperatur von 32-34°C gekühlt werden.	Patienten, die einen Herzstillstand überstanden haben, sollten für 12- 24 h auf eine Körperkerntemperatur von 32-34°C gekühlt werden.
70 (linke Spalte)		Bei ca. ¼ der Patienten entwickelt sich eine hypertrophisch obstruktive Kardiomyopathie (HOCM), (...).	Bei ca. 2/3 der Patienten entwickelt sich eine hypertrophisch obstruktive Kardiomyopathie (HOCM), (...).
82 (linke Spalte)		Cave: Bei einer zu schmalen oder zu locker angelegten Manschette misst man zu hohe Werte!	Cave: Bei einer zu schmalen Manschette misst man zu hohe Werte! Wird die Manschette zu gering aufgepumpt, können zu niedrige Werte gemessen werden.
138 (linke Spalte)		RPI = Retikulozyten in % x Ist-Hämatokrit/ x 100 Ret-Shift in Tagen x Norm-Hämatokrit (45)	RPI = Retikulozyten in % x Ist-Hämatokrit/ Ret-Shift in Tagen x Norm-Hämatokrit (45)
212 (Tab. 3.3)		<i>((nur die Erkrankungen der Klasse 1 sind pulmonal-arterielle Hypertonien; Klasse 2-5 sind pulmonale Hypertonien))</i>	
235 (rechte Spalte, Barrett-Ösophagus)		Kontrollendoskopien im Abstand von 3 Jahren (short Barrett) bzw. 4. Jahren (long Barrett) sind empfehlenswert.	Kontrollendoskopien im Abstand von 4 Jahren (short Barrett) bzw. 3 Jahren (long Barrett) sind empfehlenswert.
263 (Merke)		Ein Serumlaktat Spiegel von > 20 µg/ml ist bei Verdacht (...)	Ein Serumlaktat Spiegel von > 4 mmol/l ist bei Verdacht (...) <i>((Normwerte von Laktat: 5,7–22 mg/dl bzw. 0,63–2,44 mmol/l))</i>
266 (rechte Spalte)		Typisch für die obstruktive intrahepatische Cholestase ist das sog. Doppelflintenphänomen, das durch die parallel verlaufenden Lumina der erweiterten Gallengänge und Lebervenen entsteht.	Typisch für die obstruktive intrahepatische Cholestase ist das sog. Doppelflintenphänomen, das durch die parallel verlaufenden Lumina der erweiterten Gallengänge und Portal venen entsteht.

271 (Tab. 5.5)		<p>Impfung</p> <ul style="list-style-type: none"> • positiv: Anti-HBs • negativ: Anti-HBV-IgG 	<p>Impfung</p> <ul style="list-style-type: none"> • positiv: Anti-HBs • negativ: Anti-HBc-IgG
294 (rechte Spalte)		Eine akute Cholezystitis äußert sich klinisch durch kolikartige Schmerzen und (...)	Eine akute Cholezystitis äußert sich klinisch durch Dauerschmerzen und (...)
315 (rechte Spalte)		Bei der psychogenen Polydipsie steigt die Urinosmolalität an und die Plasmaosmolalität bleibt gleich.	Bei der psychogenen Polydipsie steigt im Durstversuch die Urinosmolalität an und die Plasmaosmolalität bleibt gleich.
328 (Tab. 3.5)		Sonografiebefund bei Hashimoto-Thyreoiditis: homogen echoarm	Sonografiebefund bei Hashimoto-Thyreoiditis: diffus echoarm
344 (linke Spalte)		90 % der Tumoren treten beidseitig auf, 10% einseitig.	90 % der Tumoren treten ein seitig auf, 10% beidseitig.
345 (linke Spalte)		Metastasen können darüber hinaus nuklearmedizinisch mit ¹²³ Jod-MIBG behandelt werden.	Metastasen können darüber hinaus nuklearmedizinisch mit ¹³¹Jod -MIBG behandelt werden.
345 (Tab.5.5)		wie MEN IIa und zusätzlich Schleimhautneurinome (...) sowie marfanoider Habitus	medulläres Schilddrüsenkarzinom, Phäochromozytom, Schleimhautneurinome (...) sowie marfanoider Habitus
355 (linke Spalte, Merke)		<ul style="list-style-type: none"> • 10-15 mmol/h K+/h bei Serum-Kalium < 3 mmol/l • 15-20 mmol/h K+/h bei Serum-Kalium zwischen 3 und 4 mmol/l • 20-25 mmol/h K+/h bei Serum-Kalium > 4 mmol/l 	<ul style="list-style-type: none"> • 20-25 mmol K+/h bei Serum-Kalium < 3 mmol/l • 15-20 mmol/h K+/h bei Serum-Kalium zwischen 3 und 4 mmol/l • 10-15 mmol K+/h bei Serum-Kalium > 4 mmol/l
378 (linke Spalte, vgl. A380 und C114)		Leukozyturie: Nachweis von Leukozyten im Urin (> 4/µl). Geringe Mengen (< 4/µl)...	Leukozyturie: Nachweis von Leukozyten im Urin (> 10 /µl). Geringe Mengen (< 10 /µl)...
483 (rechte Spalte)	neu	Pharmakotherapie der PSS: (...) Während eines akuten Schubs mit hoher Entzündungsaktivität – v.a. in der ödematösen Frühphase – werden Glukokortikoide eingesetzt.	Pharmakotherapie der PSS: (...) Während eines akuten Schubs mit hoher Entzündungsaktivität – v.a. in der ödematösen Frühphase – werden Glukokortikoide eingesetzt. Cave: Hohe Dosierungen können renale Krisen auslösen!
504 (Tab. 1.4)		Protozoen (Pneumocystis jiroveci, Toxoplasma gondii)	Protozoen (Toxoplasma gondii) <i>((Pneumocystis jiroveci wird zu den hefeähnlichen Pilzen gezählt, vergleiche S. A565))</i>

506 (Tab. 1.7)		<i>((die orale Poliovakzine muss unter dem Punkt „Viren“ genannt werden))</i>	
508 (Tab. 1.9)		Impfempfehlung für HPV: Standardimpfung ab 18 Jahren	Impfempfehlung für HPV: Standardimpfung zwischen 9-14 Jahren
510 (linke Spalte)		<i>Die Liste der meldepflichtigen Krankheiten nach §6(1) Nr.1 IfSG wurde mit Wirkung vom 29. März 2013 um Erkrankungs-, Verdachts- und Todesfälle von Mumps, Pertussis, Röteln und Varizellen erweitert.</i>	
558 (linke Spalte)	neu	Impfung: (...) Seit März 2007 empfiehlt die STIKO die Impfung aller Mädchen im Alter von 12–17 Jahren.	Impfung: (...) Die STIKO empfiehlt die Impfung aller Mädchen im Alter von 9–14 Jahren (stand 2016).
605 (linke Spalte)		Knochenmarkschädigungen durch (...) verschiedene Zytostatika (...) v.a. Topoisomerase-II-Hemmstoffe wie Irinotecan.	Knochenmarkschädigungen durch (...) verschiedene Zytostatika (...) v.a. Topoisomerase-II-Hemmstoffe. <i>((Irinotecan ist ein Topoisomerase-I-Hemmstoff))</i>
619 (Tab. 3.20)		Alter < 45 Jahre	Alter ≥ 45 Jahre
Band B			
44 (rechte Spalte)		Als Ultima Ratio kann beim kreislaufstabilen Patienten eine Kardioversion in Kurznarkose durchgeführt werden.	Als Ultima Ratio kann beim kreislauf in stabilen Patienten eine Kardioversion in Kurznarkose durchgeführt werden.
56 (linke Spalte, Merke)		Dauert ein zerebraler Krampfanfall länger als 15 min, (...) spricht man von einem Status epilepticus.	Dauert ein zerebraler Krampfanfall länger als 5 min , (...) spricht man von einem Status epilepticus.
93 (Definition)		projizierter Schmerz: (...)	übertragener Schmerz: (...)
122 (rechte Spalte)		Der sekundäre Hypoparathyreoidismus erfordert bei Beschwerden (...)	Der sekundäre Hyper parathyreoidismus erfordert bei Beschwerden (...)
129 (rechte Spalte)		Hernie durch das muskelfreie Larrey-Dreieck (Trigonum sternocostale): rechtsseitig: Larrey-Hernie linksseitig: Morgagni-Hernie	Hernie durch das muskelfreie Larrey-Dreieck (Trigonum sternocostale): rechts seitig: Morgagni -Hernie links seitig: Larrey -Hernie
130 (linke Spalte)		Ein stumpfer His-Winkel (= Winkel zwischen Magenfundus und intraabdominalem Ösophagus < 90°) (...)	Ein stumpfer His-Winkel (= Winkel zwischen Magenfundus und intraabdominalem Ösophagus > 90°) (...)
132 (linke Spalte)		(...) G-Zellen nur im Bereich der Kardia.	(...) G-Zellen v.a. im Antrum .

144 (linke Spalte)		Psoaszeichen: (...) Ausgelöst durch das Strecken des Beins.	Psoaszeichen: (...) Ausgelöst durch das Beugen des Beins in der Hüfte gegen einen Widerstand.
144 (linke Spalte)		Rovsing-Zeichen: Schmerzen auf der linken Seite bei retrogradem Ausstreichen des linken Kolons	Rovsing-Zeichen: Schmerzen auf der rechten Seite bei retrogradem Ausstreichen des linken Kolons
205 (linke Spalte)		Nachblutungen mit Indikation zur Rethorakotomie, z.B. Herzbeutelamponade (... ZVD ↓)	Nachblutungen mit Indikation zur Rethorakotomie, z.B. Herzbeutelamponade (... ZVD ↑)
253 (linke Spalte)		Das Ewing-Sarkom und das Osteochondrom treten v.a. im Kindes- und Jugendalter auf, (...)	Das Ewing-Sarkom und das Osteo sarkom treten v.a. im Kindes- und Jugendalter auf, (...)
262 (Abb. 9.6)		Röntgenbefund bei Spondylarthrose.	Röntgenbefund bei Osteochondrose . <i>((Der Pfeil zeigt auf eine degenerative Veränderung zwischen 2 Wirbelkörpern, daher Osteochondrose. Eine Spondylarthrose befindet sich zwischen den kleinen Wirbelgelenken (Facettengelenke).))</i>
265 (rechte Spalte)		Stabile Frakturen können meistens konservativ behandelt und mittels Schanz-Krawatte, Gipsverband oder Halo-Fixateur ruhiggestellt werden.	<i>Die Anlage eines Schanz-Kragens oder anderer mechanisch ruhigstellender Vorrichtungen (meist überflüssig. Ausnahme: Instabilität, massivster Bewegungsschmerz), kann Chronifizierung fördern (Schnabel et al. 2004) und wird daher laut dgn.org nicht empfohlen.</i>
276 (rechte Spalte)		Bei Epicondylitis humeri ulnaris kommt es bei Beugung des supinierten Handgelenks zu Schmerzen (Cozen-Test).	Bei Epicondylitis humeri ulnaris kommt es bei Beugung des supinierten Handgelenks zu Schmerzen (umgekehrter Cozen-Test). <i>((Der Cozen-Test wird auch bei V.a. Epicondylitis humeri radialis durchgeführt: Der Patient soll den Arm gegen den Widerstand des Untersuchers dorsalexstendieren.))</i>
364 (linke Spalte)		FIGO IA1: <ul style="list-style-type: none"> • ohne Risikofaktoren: (...) • ohne Risikofaktoren (...) 	FIGO IA1: <ul style="list-style-type: none"> • ohne Risikofaktoren: (...) • mit Risikofaktoren (...)
441 (rechte Spalte)		Dabei wird Glutamin durch Valin ausgetauscht (...)	Dabei wird Glutamins äure durch Valin ausgetauscht (...)

445 (linke Spalte)		Ein Defekt des Androgen-Rezeptors führt zu einer Androgen-Resistenz, wodurch trotz funktionsfähiger Hoden die Weiterdifferenzierung der Wolff-Gänge ausbleibt, die Müller-Gänge persistieren und sich ein weiblicher Phänotyp ausbildet (testikuläre Feminisierung).	<i>((Bei der testikulären Feminisierung persistieren die Müller-Gänge aufgrund des von den Sertoli-Zellen gebildeten Anti-Müller-Hormons nicht, vgl. S. B550))</i>
472 (Tab. 2.4)		asymmetrischer tonischer Nackenreflex: Bei passiver Kopfbeugung streckt das Kind die gleichseitigen Extremitäten und streckt die kontralateralen (Fechterstellung).	asymmetrischer tonischer Nackenreflex: Bei passiver Kopfbeugung streckt das Kind die gleichseitigen Extremitäten und beugt die kontralateralen (Fechterstellung).
778 (rechte Spalte)		<i>((Der M. cricothyreoideus (M. anticus) ist ein äußerer Kehlkopfmuskel))</i> Fällt der N. laryngeus recurrens aus, stehen die Stimmlippen in Paramedianstellung (die Glottisöffner überwiegen).	Fällt der N. laryngeus recurrens aus, stehen die Stimmlippen in Paramedianstellung (<i>der M. cricothyreoideus zieht die Stimmlippe in die Mittellinie</i>).
799 (rechte Spalte)		Die Hörbahn verläuft weiter über die untere Olive (...)	Die Hörbahn verläuft weiter über die obere Olive (...)
916 (Tab. 4.2)		<i>((Die EEG-Wellen sind vertauscht))</i> 1. Bild: Delta-Wellen 2. Bild: Theta-Wellen 3. Bild: Alpha-Wellen 4. Bild: Beta-Wellen	1. Bild: Alpha -Wellen 2. Bild: Beta -Wellen 3. Bild: Theta -Wellen 4. Bild: Delta -Wellen
926 (Abb. 5.3)		CCT bei Normaldruckhydrozephalus.	MRT (T2-Wichtung) bei Normaldruckhydrozephalus.
939 (rechte Spalte)		Makroskopisch erkennt man eine generalisierte Hirnatrophie, die v.a. bitemporal und frontal ausgeprägt ist.	Makroskopisch erkennt man eine generalisierte Hirnatrophie, die v.a. bitemporal und parietal ausgeprägt ist.
951 (Abb. 5.21)		Unregelmäßig begrenzte, hypointense Struktur (...)	Unregelmäßig begrenzte, hypodense Struktur (...)
960 (rechte Spalte, Definition)		Über mehr als 15 min andauernder tonisch-klonischer Anfall (...)	Klinische Definition: Über mehr als 5 min andauernder tonisch-klonischer Anfall (...) (<i>vgl. aktuelle Leitlinien: http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-079l_S1_Status_epilepticus_im_Erwachsenenalter_2012.pdf</i>)
974 (Tab. 7.3)		<i>((Die Abbildungen von intradural intramedullär und extradural sind vertauscht))</i>	
Band C			
97 (Tab. 6.2)		Gesamteiweiß: > 30 g/dl bzw. < 30 g/dl	Gesamteiweiß: > 30 g/l bzw. < 30 g/l

238 (Tab. 6.1)		Flavivirus: Masern	Paramyxovirus: Masern
337 (linke Spalte)		Die High Grade intraepitheliale Neoplasie stellt eine schwerwiegende Veränderung dar und zählt deshalb zu den fakultativen Präkanzerosen.	Die High Grade intraepitheliale Neoplasie stellt eine schwerwiegende Veränderung dar und zählt deshalb zu den obligaten Präkanzerosen.
513 (linke Spalte)		Als Kontrastmittel dient neben jodhaltigen Lösungen auch Kohlenmonoxid.	Als Kontrastmittel dient neben jodhaltigen Lösungen auch Kohlendioxid.
629 (rechte Spalte, Clostridium difficile)		Toxin A ist ein Zytotoxin (...). Toxin B ist ein Enterotoxin (...).	Toxin A ist ein Enterotoxin (...). Toxin B ist ein Zyto toxin (...). <i>((Vergleiche S. A519))</i>
636 (rechte Spalte)	neu	Chlamydia trachomatis Nachweis: <ul style="list-style-type: none"> • Serovar trachoma: (...) • Serovar lymphogranuloma venereum: (...) 	Chlamydia trachomatis Nachweis: <ul style="list-style-type: none"> • Biovar trachoma: (...) • Biovar lymphogranuloma venereum: (...)
672 (rechte Spalte, Filoviridae)		Steckbrief: Viren mit linearer ss-RNA, kubisch, (...)	Steckbrief: Viren mit linearer ss-RNA, helikal , (...)
869 (rechte Spalte)		LR = 1 – Spezifität/Sensitivität	LR = 1 – Sensitivität /Spezifität